نشرة العبوة: معلومات تهم المستخدم

برونكوستوب® دو أقراص استحلاب مضادة للسعال

المواد الفعالة: المستخلص الجاف لعشبة الزعتر، المستخلص الجاف لجذور الخطمية الطبية

اقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك.
دائماً احرص على تناول هذا الدواء كما هو موصوف تماماً في هذه النشرة أو كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي أو ممارس الرعاية الصحية.
- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو المشورة اسأل الصيدلي أو ممارس الرعاية الصحية المؤهل.
- إذا ظهرت لديك أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. انظر القسم4.
- يجب عليك إخبار الطبيب إذا لم تشعر بتحسن أو إذا شعرت بسوء بعد 5 أيام.

محتويات هذه النشرة:

1. ما هو برونكوستوب® دو أقراص استحلاب مضادة للسعال وما دواعي استعماله
2. ما يجب معرفته قبل تناول برونكوستوب® دو أقراص استحلاب مضادة للسعال؟
3. طريقة تناول برونكوستوب® دو أقراص استحلاب مضادة للسعال
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيفية تخزين برونكوستوب® دو أقراص استحلاب مضادة للسعال
6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

1.ما هو برونكوستوب® دو أقراص استحلاب مضادة للسعال وما دواعي استعماله

منتج عشبي طبي تقليدي يستخدم للتخفيف من تهيج البلعوم والسعال الجاف المصاحب له، كما يساعد على طرد البلغم عند وجود المخاط اللزج المصاحب لنزلات البرد.

المنتج عبارة عن علاج طبي عشبي تقليدي، للاستخدام في أغراض محددة حصراً، على أساس الاستخدام طويل الأمد.

برونكوستوب® دو أقراص استحلاب مضادة للسعال مخصصة للبالغين والمراهقين والأطفال من سن 4 سنوات.
يجب عليك التحدث إلى الطبيب، إذا لم تشعر بتحسن أو إذا شعرت بسوء بعد 5 أيام.

2.ما يجب معرفته قبل تناول برونكوستوب® دو أقراص استحلاب مضادة للسعال

لا تأخذ أقراص برونكوستوب® دو، إذا كنت تعاني من حساسية مفرطة (مصاب بالحساسية)، من عشبة الزعتر وجذور الخطمية الطبية أو من أي نوع من أنواع نباتات الفصيلة الشفوية أو أي مكون من مكونات هذا الدواء (الواردة في القسم 6).

التحذيرات والاحتياطات
استشر الطبيب أو الصيدلاني، قبل استعمال أقراص برونكوستوب ® دو .
يجب الرجوع للطبيب إذا كنت تعاني من الربو أو كنت عرضة لردود الفعل التحسسية. هناك خطر محتمل من أن هذا الدواء قد يؤدي إلى تفاعلات حساسية شديدة لدى المرضى الذين لديهم تاريخ من الحساسية أو الربو. يجب إيقاف العلاج عند أول علامة على حدوث رد فعل تحسسي (انظر القسم 4 لمعرفة الآثار الجانبية المحتملة).

لا ينبغي أن يؤخذ **برونكوستوب® دو أقراص استحلاب مضادة للسعال،** قبل أو بعد تناول أدوية أخرى، لمدة نصف ساعة إلى ساعة واحدة ،كإجراء وقائي، إذ إنه يؤخر امتصاص الأدوية المتزامن تناولها مع برونكوستوب® دو استحلاب مضادة للسعال.
الأطفال
لا ينصح بإعطائه للأطفال دون سن 4 سنوات بسبب عدم توفر المعلومات الكافية حول ذلك بالإضافة لخطر ابتلاع القرص بالكامل عن غير قصد.
الأدوية الأخرى و برونكوستوب® دو أقراص استحلاب مضادة للسعال
أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي أدوية أخرى.
وكإجراء وقائي يجب تأخير تناول الأدوية التي يتم تناولها بشكل متزامن، لا ينبغي تناول المنتج قبل أو بعد تناول المنتجات الطبية الأخرى بنصف ساعة إلى ساعة واحدة.

لم يتم إجراء أي دراسات للتفاعل مع الأدوية الأخرى.
حتى الآن، لم تُعرف أي تفاعلات مع أدوية أخرى.
الحمل والرضاعة والخصوبة
استشيري الطبيب أو الصيدلاني قبل استخدام هذا الدواء، إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين أنك حامل أو تخططين لإنجاب طفل.
ينصح بعدم استخدام هذا الدواء، أثناء الحمل أو الرضاعة لعدم وجود بيانات كافية حول ذلك.
القيادة واستخدام الآلات
لم يتم إجراء أي دراسات، حول التأثيرات على القدرة على القيادة أو استخدام الآلات.
يحتوي برونكوستوب® دو أقراص استحلاب مضادة للسعال على المالتيتول والسوربيتول
يحتوي قرص الاستحلاب الواحد من هذا الدواء، على 615 ملجم من المالتيتول و210 ملجم من السوربيتول.
يعد السوربيتول مصدراً للفركتوز.
استشر طبيبك عند تلقيك أو قبل تناولك (أو تناول طفلك) لهذا الدواء، إذا أخبرك طبيبك أنك تعاني (أو أن طفلك يعاني) من عدم تحمل بعض السكريات أو إذا تم تشخيص إصابتك بمرض عدم تحمل الفركتوز الوراثي - وهو مرض وراثي نادر حيث يتسم بعدم قدرة المريض على تحطيم الفركتوز.

ملاحظة لمرضى السكري:
يعادل قرص استحلاب واحد تقريباً 0.1 وحدة من الكربوهيدرات.
يحتوي برونكوستوب® دو أقراص استحلاب مضادة للسعال على بروبيلين جلايكول وكحول البنزيل والصوديوم
يحتوي قرص الاستحلاب الواحد من هذا الدواء على 6.42ملجم من البروبيلين جلايكول و 0.005 ملجم من كحول البنزيل. يمكن أن يسبب كحول البنزيل ردود فعل تحسسية.
يحتوي القرص الواحد من هذا الدواء على أقل من 1 مليمول من الصوديوم، ما يعني أنه خالي تقريباً من الصوديوم.

3.طريقة تناول برونكوستوب® دو أقراص استحلاب مضادة للسعال

احرص دائماً على الالتزام بتناول هذا الدواء، كما هو موصوف في هذه النشرة تماماً أو كما وصفه طبيبك أو الصيدلي لك. يجب الرجوع إلى طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً.

الجرعة الموصى بها:
للبالغين وكبار السن والأطفال من سن 12 عاماً:
قرصين كل 3 إلى 4 ساعات (4 إلى 6 مرات في اليوم، الحد الأقصى المسموح به في اليوم هو 12 قرص)
الأطفال بعمر 4 إلى 11 عاماً:
قرص واحد كل 3 إلى 4 ساعات (4 إلى 6 مرات في اليوم، الحد الأقصى المسموح به في اليوم هو 6 أقراص)
استخدام الدواء لدى للأطفال:
لا ينصح باستخدام الأطفال دون سن 4 سنوات، بسبب عدم توفر المعلومات الكافية حول ذلك، بالإضافة لخطر ابتلاع القرص بالكامل عن غير قصد.
طريقة الاستخدام:
الاستخدام عن طريق الفم.
اتركه يذوب في الفم عن طريق المص.
مدة الاستخدام:
يجب عليك إخبار الطبيب، إذا لم تشعر بتحسن أو إذا شعرت بسوء بعد 5 أيام.
إذا تناولت برونكوستوب® دو أقراص استحلاب مضادة للسعال أكثر مما يجب
لا توجد حالات معروفة لجرعة زائدة.
في حال نسيت أن تتناول برونكوستوب® دو أقراص استحلاب مضادة للسعال
لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، حول استخدام هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

4.الآثار الجانبية المحتملة

قد يسبب **برونكوستوب® دو أقراص استحلاب مضادة للسعال** بعض الآثار الجانبية مثل باقي الأدوية، ولكنها لا تحدث بالضرورة لجميع المرضى.

يمكن أن يسبب هذا الدواء ردود الفعل التحسسية الخطيرة التالية. إذا شعرت بأي من الآثار الجانبية التالية، توقف عن تناول هذا الدواء فورًا واطلب المشورة الطبية:
- ردود فعل تحسسية مفاجئة وشديدة، مع صعوبة في التنفس، وتورم، ودوار، وسرعة ضربات القلب، والتعرق، وفقدان الوعي
- تورم سريع تحت الجلد في مناطق مثل الوجه والحنجرة والذراعين والساقين
- صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس
الآثار الجانبية المحتملة الأخرى
إذا أصبحت أي من الآثار الجانبية التالية خطيرة أو تقلقك، أو لاحظت أي آثار جانبية أخرى، توقف عن تناول هذا الدواء واطلب المشورة الطبية في أقرب وقت ممكن:
- تفاعلات حساسية جلدية تشمل طفح جلدي، حكة وطفح جلدي مثير للحكة.
- اضطرابات المعدة والأمعاء مثل آلام البطن أو عدم الراحة، والإسهال، والقيء، والغثيان.

مدى تكرار حدوث الآثار الجانبية غير معروف (لا يمكن تقدير معدل التكرار من خلال البيانات المتاحة).

الإبلاغ عن الآثار الجانبية
إذا لاحظت أي آثار جانبية، أخبر طبيبك أو الصيدلي.
هذا ينطبق أيضاً على الآثار الضارة، غير المدرجة في هذه النشرة.
يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرةً من خلال **نظام التقارير الوطنية المدرجة في الملحق الخامس.**
يمكنك المساهمة في توفير المزيد من المعلومات، حول سلامة هذا الدواء من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية.

5.كيفية حفظ برونكوستوب® دو أقراص استحلاب مضادة للسعال

لا يحفظ في درجة حرارة أكثر من 30 درجة مئوية.
يحفظ هذا الدواء بعيداً عن أنظار ومتناول أيدي الأطفال.
لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، المدون على الشريط والعلبة الكرتونية بعد "الاستخدام قبل".
يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
لا تتخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. تساعد هذه الإجراءات في حماية البيئة.

6.محتويات العبوة ومعلومات أخرى

على ماذا يحتوي برونكوستوب® دو أقراص استحلاب مضادة للسعال
المواد الفعالة: المستخلص الجاف لعشبة الزعتر، المستخلص الجاف لجذور الخطمية الطبية.
يحتوي قرص الاستحلاب الواحد على:
51.1 ملجم من المستخلص الجاف لعشبة الزعتر (عشبة الزعتر ، نسبة الخلاصة الدوائية = 7-13: 1 ؛ عامل الاستخلاص: الماء)، و 4.5 ملجم من المستخلص الجاف لجذور الخطمية الطبية (جذر الخطمية الطبية ، نسبة مستخلص الدواء = 7-9: 1 ؛ عامل الاستخراج: الماء)

المكونات الأخرى هي:
صمغ عربي (إي 414)، مالتيتول سائل (إي 965)، سوربيتول سائل 70٪ (غير متبلور) (إي 420)، مالتوديكسترين، حامض الستريك، سكرين الصوديوم، نكهة التوت البري (يحتوي على البروبيلين جليكول (إي 1520))، نكهة ثمر الغابة (يحتوي على البروبيلين جليكول (إي 1520) وكحول البنزيل (إي 1519)، سائل البرافين الخفيف، ماء منقى.
ما هو شكل برونكوستوب® دو أقراص استحلاب مضادة للسعال وما هي محتويات العبوة.
أقراص استحلاب مستديرة بنية اللون في شريط بلاستيكي من البي في سي/بي إي إي/بي في دي سي-ألومينيوم يحتوي على 10، 20، 30 أو 40 قرص محلى.
لم يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

مالك حق التسويق ومصدر الدفعات:
شركة كويزدا فارما جي.أم.بي. أتش
إفينجرجاس 21
1160 فيينا، النمسا

المصنع الكلي و مصنع التغليف:
بولدير الدوائية المحدودة وشركاه.
رينيشي أللي 11, 50858 شمال ويستفاليا.
كولوني, ألمانيا

تم آخر تعديل لهذه النشرة بتاريخ يناير 2024

هذا المنتج هو دواء
- الدواء هو منتج يؤثر على الصحة، وتناوله بشكل مخالفًا للتعليمات يشكل خطرًا على الصحة.
- لابد من اتباع وصفة الطبيب بعناية، واتباع ارشادات صيدلي الصرْف حول كيفية استخدام الدواء.
- الطبيب، والصيْدلي هم خبراء الدواء، والأكثر دراية بفوائده، وأضراره.
- لا ينبغي التوقُّف عن تناول الدواء قبل انتهاء الفترة المُحدَّدة للعلاج من قبل الطبيب.
- لا تُكَرَّر الروشتة الطبية دون استشارة الطبيب.
- لابدَّ من حفظ جميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب،
اتحاد الصيادلة العرب